

ボトックス注入治療 同意書

- ボトックス注射とは、ボツリヌス菌がつくり出すA型ボツリヌス毒素(天然のタンパク質)を有効成分とする薬剤(ボツリヌストキシン製剤)を用いた治療です。
- 治療効果は 2・3日～2週間で現れ、通常4～6ヵ月程度持続しますが、個人差があります。
繰り返していると、稀に耐性が生じ、効果が出なくなることがあります。
- 注射後は強くこすったり、押さえたりしないでください。
また、内出血、多少の赤み、腫れ、感染症状、硬結、かゆみ、疼痛、発疹、頭痛、アレルギー症状などが出現することがあります。まれに腫れが強く出現したり、内出血が生じたりする場合には、落ち着くまでに1～2週間程度要す場合があります。
- ボトックスの効果が強く出現したり、意図していない筋肉に作用したりする場合、見た目の違和感や表情の動かし難さを感じる場合があります（例：まぶたが重い、目が開きづらいなど）。
また、上記以外の副作用が現れる可能性がありますので、体調の変化や心配なことがあった場合には、医師にご連絡してください。
- 脱力感、筋力低下、めまい、視力低下が現れることが稀にあります。
- 妊娠中、授乳中の方は治療を受けられません。また、妊娠する可能性のある方は、ボトックスの投与中および最終投与後の2回の月経を経るまでは避妊するようにしてください。
- 男性は、ボトックスの投与中および最終投与後の少なくとも3ヵ月は避妊するようにしてください。
- 下記の方は治療を受けることができません。医師に申告してください。
 - 20歳未満の方
 - この薬を以前に使用し、発疹などのアレルギーを経験したことがある方、アレルギー体质の方、重度の筋力低下のある方、全身性の筋肉の病気の方（重症筋無力症、ランバード・イートン症候群、筋萎縮性側索硬化症の方）
- 下記の方は、必ず事前に医師に申告してください。
 - 他の医療施設でボトックスの投与を受けている方、喘息など慢性的な呼吸器の病気がある方、緑内障のある方
- 使用中の薬剤は、市販薬も含め医師にお申し出て下さい。
 - 特に抗生物質、パーキンソン病の治療薬、筋弛緩薬、精神安定剤等の投与を受けている方

私は上記内容を理解し、自己自身の意思で施術に同意します。

○本人

令和 年 月 日 氏名